

PACHET AMBULATOR

I. Obiective

1. *Diminuarea internarilor in spitalizare continua*
2. *Rezolvarea episoadelor de ingrijire la nivelul ambulatorului de specialitate prin optimizarea resurselor/cost-eficacitate*
3. *Cresterea accesului populatiei la servicii medicale*
4. *Eficientizarea calitatii serviciilor acordate prin coordonarea ingrijirii*
5. *Optimizarea timpului de ingrijire*

II. Definitii – tipuri de consultatii:

1. **Consultatie scurta** (consultatia de nivel A): ingrijirea pentru o problema certa, in relatie cu una sau mai multe boli, pentru care se aplica deja un plan de management, caracterizata prin sarcini simple ce includ oricare din urmatoarele:
 - Istorie scurta a evolutiei bolii pacientului
 - Examinare clinica limitata
 - **Management limitat al bolii** (ex. prescriere medicatie, concediu medical, urmarire indicatii igieno-dietetice, bilet trimis ambulator/spital conform planului initial de management)
 - Inregistrare informatii clinice in dosarul pacientului
 - Durata medie a consultatiei este de 5 minute
 - Consultatia poate fi la cabinet sau la domiciliuSe efectueaza atat de catre medicul de familie cat si de catre medicul specialist
2. **Consultatie standard** (consultatia de nivel B)
B1: *ingrijirea pentru o problema care nu este certa, in relatie sau nu cu una sau mai multe boli preexistente, incluzand cel putin 2 din urmatoarele:*
 - **Anamneza detaliata**
 - **Examinarea clinica specifica specialitatii** (inclusiv manevrele uzuale din practica curenta)
 - **Stabilirea planului de investigatii** cu interpretare
 - **Stabilirea planului de management al bolii**, inclusiv acte de suport(prescriptie,concediu medical,scrisoare medicala)
 - **Inregistrarea detaliilor clinice in dosarul pacientului**

PACHET AMBULATOR

B2: *ingrijirea pentru monitorizarea pacientului cu una sau mai multe afectiuni cronice de lunga durata, pentru care exista o periodicitate mentionata in planul de management*, incluzand: bilantul starii de sanatate; ex clinic; investigatii; urmarirea si/sau actualizarea planului de management; acte de suport.

- Durata medie a consultatiei este de 20 minute

3. **Consultatia lunga sau complexa** (consultatia de nivel C): ingrijirea pentru o problema care nu este certa, in relatie sau nu cu una sau mai multe boli preexistente, incluzand oricare din urmatoarele:

- Anamneza detaliata
- Examinarea clinica specifica specialitatii/specialitatilor
- Stabilirea planului de investigatii si interpretare
- Stabilirea si implementarea planului de management al bolii, care va fi transmis si medicului de familie, inclusiv acte de suport (prescriptie medicala, concediu medical, scrisoare medicala)
- Acordarea de ingrijiri preventive si consiliere specifica specialitatii
- Inregistrarea detaliilor clinice

Durata medie a consultatiei este de 40 minute

Frecventa consultatiilor:

1. *Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)*
2. *Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an*

*excepțiile vor fi menționate la rubrica frecvență/plafon

Criteriile de eligibilitate prezentate pentru consultatiile din ambulatoriul de specialitate vor orienta acordarea serviciilor medicale la acest nivel fara a se limita la afectiunile exemplificate in sectiunea III. punctul A. Consultatii.

PACHET AMBULATOR

III. DETALIERE PE SPECIALITATI MEDICALE SI CHIRURGICALE

A. CONSULTATII:

1. Alergologie și imunologie clinică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate-prioritate pentru trimiteri din asistență primară</i>	<i>Frecvența/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii Consultatia cuprinde si educarea pacientului/familiei	<p><u>Nivel 1: maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Istoric recent de anafilaxie /lipsa planului de management •Suspiciune de rash cutanat vasculitic •Boala auto-imuna activa fara semne de afectare a organelor tinta <p><u>Nivel 2: maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Istoric de anafilaxie la agenti cunoscuti / elaborarea planului de management •Trimitere pentru desensibilizare •Urticaria acuta recurenta sau care nu cedeaza la tratamente uzuale •Evaluarea bolilor auto-imune fara afectare a organelor-tinta <p><u>Nivel 3: maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Evaluare si management in rinita alergica •Evaluare a imunoterapiei legat de aero-alergeni 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> • Alergii medicamentoase sau de contact la agenti cunoscuti evitabili • Evaluare si management in urticarial cronica • Alergia alimentara ne-anafilactoidea • Suspiciune de imunodeficienta in absenta complicatiilor • Evaluarea autoanticorpilor la asimptomatici 		
--	--	---	--	--

2. Boli infecțioase

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii *conform criterii boli infectioase	Sindrom febril prelungit Febra si rush Infectia HIV - se trimite pentru confirmare diagnostic si luare in evidență, monitorizare Afecțare hepatică acută la persoane HIV pozitive - se trimite pentru confirmare diagnostic și luare in evidență, monitorizare Infectia hepatica virală – pentru confirmare diagnostic si luare in evidență, monitorizare	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

PACHET AMBULATOR

		<p>Infectii complexe ale maduvei spinarii, organelor transplantate, implanturilor</p> <p>Infectii complexe la nivelul tesuturilor si sistemului musculoscheletic</p>		
--	--	--	--	--

3. Cardiologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1:</u> în maxim 14 zile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stenoza aortică simptomatică • Hipertensiunea arterială severă și refractoră la tratament • Boala cardiovasculară la gravidă <p><u>Nivel 2:</u> în maxim 1 lună</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuficiența cardiacă NYHA IV • Angina pectorala CSC 3 și 4 • Boala valvulară simptomatică • Deteriorare funcțională recentă în insuficiența cardiaca aflată sub tratament • Fibrilată atrială nou descoperită 	<p>Pentru boala acută: 2 consultatii (1 consultatie initială, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronică: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> •BAV grd 2 si 3 •Sulflu cardiac nou aparut la pacient cardiovascular cunoscut •Suspiciunea de HTAE malignă <p><u>Nivel 3: în maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sufluri/ cardiomegalie asimptomatice nou descoperite •Suspiciunea de hipertensiune arterială secundară/ HTAE rezistenta la tratament •Tulburari de ritm nou instalate cu/fara semne de afectare hemodinamica si /sau de afectare structurala cardiacă 		
--	--	---	--	--

4. Chirurgie cardiovasculară

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	* pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: 1. (I65.2) Ocluzia si stenoza arterei carotide <i>In primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand</i>

PACHET AMBULATOR

				<p><i>din al treilea an 1 data pe an si de 2 ori pe an in cazul stenozelor fara indicatie operatorie.</i></p> <p>2.(I70.21)Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an; la pacientii neoperati de 2 ori pe an.</i></p> <p>3. (I70.22) Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu durere la repaos: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>4. (I70.22) Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu ulceratie: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>5. (I70.24)Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu gangrene: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>6. (I71.2) Anevrismul toracic, fara mentiunea rupturii: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an; la cei neoperati de 2 ori pe an.</i></p> <p>7. I71.4 Anevrismul abdominal, fara mentiunea rupturii: <i>in primul an</i></p>
--	--	--	--	---

PACHET AMBULATOR

				<p><i>postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an; la cei neoperati de 2 ori / an</i></p> <p>8. (I73.1) <i>Trombangeita obliteranta [Buerger]:</i> <i>In primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an</i></p> <p>9. (I 74.0) <i>Embolia si tromboza aortei abdominale</i> <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an</i></p> <p>10. (I 74.2) <i>Embolia si tromboza arterelor extremitatilor superioare</i> <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>11. (I74.3) <i>Embolia si tromboza arterelor extremitatilor inferioare</i> <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>12. I77.0) <i>Fistula arterio-venoasa, dobindita:</i> <i>in a 2-a saptamana postoperatoriu, in a 6-a saptamana postoperatoriu si ulterior de 2 ori/an.</i></p>
--	--	--	--	---

PACHET AMBULATOR

5. Chirurgie generală

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: maxim 14 zile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Hernii ireductibile •Colecistita acuta litiazica fara febra •Chisturi cervicale cu fenomene inflamatorii •Abces perianal •Simptomatologie sugestiva pentru obstructie progresiva •Formatiuni palpabile abdominale de natura suspecta •Istoric de rectoragii suggestive pentru cauze chirurgicale •Dureri suggestive pentru diverticulita acuta •Neoplazii ale tractului gastro-intestinal <p><u>Nivel 2 maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Boala pilonidală cronică/ recurrentă •Chisturi cervicale fara fenomene inflamatorii <ul style="list-style-type: none"> • Patologie ano-rectală insotită de dureri la defecatie • Boala hemoroidală std III și IV 	<p><i>Pentru boala acuta:</i> <i>2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>Nivel 3: maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fistula perianala • Colecistita litiazica simptomatica • Unghia incarnata • Incontinenta fecala 		
--	--	---	--	--

6. Chirurgie pediatrică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

7. Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 urgent maxim 2 saptamani – 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea sau leziunea dovedita de melanom malign • Alte leziuni canceroase la 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	<p>* pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <p>1. (T30) Arsura cu</p>

PACHET AMBULATOR

	<p>nivelul fetei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afecțiuni severe ale fetei • Arsuri cu prezentare tardivă <p>Pierderi de tesut moale cu prezentare tardivă</p> <p>Nivel 2 Semiurgent Maxim 1-2 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leziuni cutanate, altele decat melanomul sau alte leziuni cutanate care cresc incet • Afecțiuni care se suprainfecteaza – chiste etc • Anomalii congenitale nedepistate la nastere – sindactilie, hipospadias etc Cicatrici vicioase care limiteaza functionalitatea normală <p>Nivel 3 de Rutina Maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leziuni cutanate benign • Lipoame • Nevi nonmelanocitari • Chiste • Cicatrici vicioase care nulimiteaza functionalitatea normală 	<p>adancime parțială și toată grosimea: 10 consultatii</p> <p>2. Malformatii congenitale la nivelul mainii sindactilii (Q70), polidactilii (Q69), maladii amniotice): 7 consultatii</p> <p>3. Malformatii congenitale la nivelul pavilionului auricular: 7 consultatii</p> <p>5. Malformatii congenitale ale fetei (Q), buzei și palatului (Q 35): 6 consultatii</p> <p>6. (S01.4, S01.5) Plagi deschise la nivelul fetei: 5 consultatii</p> <p>7. Leziune nerv la nivel antebraț și mana: 7 consultatii</p> <p>8. (S68.1, S68.2) Amputatie deget mana: 5 consultatii</p>
--	--	---

PACHET AMBULATOR

--	--	--	--	--

8. Chirurgie toracică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

9. Dermatovenerologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1: 1-Urgent maxim 14 zile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eritrodermii • Pemfigus bulos • Fitofotodermatoze cu leziuni extinse 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p>	<p>* pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <p>L.10 –L.14 Dermatoze</p>

PACHET AMBULATOR

	<ul style="list-style-type: none">• toxidermiile postmedicamentatoase• eczeme generalizate• hemangoame ulcerate• Eczema herpetica Urticaria acuta severa care nu raspunde la tratament <p><u>Nivel 2: Semi-urgent maxim 2 luni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tinea capitis• Eczema impetigiinzata• Nevi melanici congenitali gigantici• Dermatite acute de contact• Suspiciune cancer cutanatAlopecia <p><u>Nivel 3-Rutina Maxim 6 luni</u></p>	<p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	buloase (pemfigoid bulos, si altele – cu exceptia Pemfigus vulgar), boala Duhring - L13.0 : 12 consultatii lunare
--	--	--	---

PACHET AMBULATOR

10. Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1.consultatie	*conform capitol definitii		<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	
2.proceduri				

11. Endocrinologie

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent - Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulburari ale metabolismului fosfo-calcic – Suspiciunea de hipo-hiperparatiroidism • Suspiciunea de tulburari hipofizare • Suspiciunea de disfunctie a suprarenalei (Cushing sau Addison) • Oftalmopatia progresiva • Suspiciunea de HTA endocrina • Hirsutism progresiv cu masculinizare, trasaturi Cushingoide si testosterone plasmatic > 5 mmoli/L • Neutropenie pe fond de tratament cu antitiroidiene de sinteza • Suspiciune de hiperprolactinemie 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

	<p>(galactoree, amenoree/ disf erectila) Polidipsie-poliurie cu simptome severe</p> <p>Nivel 2 - semiurgent Maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaluarea complexa a hipertiroidismului nou diagnosticat• Hipertiroidismul recurrent, cu raspuns terapeutic inadecvat si/sau intoleranta la tratament• Osteoporoza la: barbati, femei tinere, suspecti de hiperparatiroidism sau alte boli ale metabolismului osos , tratament cu glucocorticoizi• Tulburari de crestere (nanism/gigantism, acromegalie)• Suspiciunea de hipogonadism prin insuficienta hipofizara <p>Polidipsie-poliurie cu simptome usoare.</p> <p>Nivel 3 Rutina maxim 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none">• Hirsutism fara semne de impregnare androgenica progresiva• Suspiciunea de hipogonadism 15asculine Amenoree secundara	
--	---	--

PACHET AMBULATOR

12. Gastroenterologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1: 1-Urgent Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anemie feripriva recenta de cauza inexplicabila • Suspiciune de stenoza pilorica • Test pozitiv pentru Hemoagia oculta in fecale • Radiologie sugestiva pentru polipi sau ulcere gastrice maligne • Suspiciune de boala inflamatorie intestinala in puseu • Disfagia • Colonul Iritatibil cu manifestari severe • Episod anamnestic de hemoragie digestiva recenta • Rectoragie documentat • Diareea persistenta (> 2 saptamani) si cronica (> 6 saptamani) cu rasunet functional • Sindromul dispeptic insotit de semne de alarma: anemie, scadere ponderala involuntara, anorexie, voma, varsta >50 ani <p>Simptomatologie pancreatico-biliara nechirurgicala</p> <p>Nivel 2- semiurgentic Maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sindrom dispeptic fara semne de alarma • Sindroame de malabsorbtie • Diarrea cronica • Scadere ponderala involuntara/ stari de vomă inexplicabile • Modificari de tranzit la persoane > 40 ani si/sau 	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: 1. K.70 - Ciroza hepatica: 12 consultatii/an 2. B 18.2 - Hepatita virală cronica C: 12 consultatii/an 3. B 18.0 B18.1 Hepatita virală B (HVB): 12 consultatii/an

PACHET AMBULATOR

		<p>semne de alarma/ rezultate anormale la explorari de rutina si/sau istoric familial sugestiv Modificare asimptomatica a testelor functiei hepatice</p> <p><u>Nivel 3 Rutina maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Supravegherea cancerelor familiale •Suspiciunea de Colon iritabil •Investigarea durerii toracice necardiac/ tusea cronica nerespiratorie Suspiciunea de sdr de malabsorbtie 		
--	--	---	--	--

13. Genetică medicală

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii Sfat si consiliere genetica.	<p><u>Nivel 2 semiurgent Maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Istoric familial care necesita testare prenatala <p><u>Nivel 3 de rutina - Maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Planificarea conceptiei intr-un cuplu in care exista istoric familial de mutatie genetica •Evaluarea riscului individual pentru persoane cu istoric familial de 		

PACHET AMBULATOR

		<p>mutatie genetica (mucoviscidoza, talasemie, surditate, acondroplazie, distrofie musculara, sdr Down, cancer familial etc)</p> <p>Persoane cu avorturi repeatate</p>		
--	--	--	--	--

14. Geriatrie și gerontologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 2: semiurgenta Maxim 2 luni</p> <p>Declin functional si/sau cognitiv la persoana varstnica</p> <p>Nivel 3: de rutina Maxim 6 luni</p> <p>Individualizarea /actualizarea planurilor de ingrijire integrata a persoanelor varstnice cu polipatologii (institutionalizate sau la domiciliu)</p>	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	
2.proceduri				

PACHET AMBULATOR

15. Hematologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: Urgent maxim 7 zile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mielom multiplu • Neutropenia • Trombocitopenie moderata • Hemofilia • Unele mielodisplazii • Unele anemii hemolitice autoimune • LLC stadiul C • Unele forme de Polictenia vera rubra Unele macroglobulinemii <p><u>Nivel 2: Semi-urgent maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • anemia hemolitica autoimmune • anemia refractara • afectiuni mieloproliferative • policitemia rubra vera (PRV)/mielofibroza esentiale • Trombocitemia • Explorarea tulburarilor trombotice • LLC stadiul B <p>Explorarea diatezelor hemoragice</p> <p>Nivel 3 maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trombocitopenia usoara/ stabile 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	<p>Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <p>1. Mielom multiplu: 1/luna in primul an, 1 la 3 luni in anii 2-5, 1 la 6 luni</p> <p>2. PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA SI CONGENITALA: lunar, ulterior trimestrial;</p>

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea de defecte plachetare • Gamapatii monoclonale cu semnificatie incerta • LLC stadiul A • Unele imunodeficiente • Investigarea macrocitozelor • Eritrocitozele (no PVR) • Mielodisplazii usoare neevaluate • Explorarea/Bilantul hemoglobinnopatiilor Anemii cronice hemolitice (ereditare) 		
--	--	---	--	--

16. Medicină internă

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1.consultatie	*conform capitol definitii	<u>Nivel 1 Urgent maxim 1 saptamana</u> <ul style="list-style-type: none"> • Agravare a conditiei la nivel de organ/sistem la pacienti cu polipatologii – pentru entitati clinice specificate la nivelul altor subspecialitati: <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologie - Gastroenterologie - Hematologie 	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: 1. FIBRILATIA ATRIALA - I. 48: 1 sapt, 1 luna de la externare, ulterior trimestrial 2. FLUTTERUL - I. 48: 1 sapt, 1 luna de la externare, ulterior

PACHET AMBULATOR

	<ul style="list-style-type: none">- Imunologie- Nefrologie- Neurologie Pneumologie- Reumatologie • Simptomatologii nespecifice/ cu cauza necunoscuta care prezinta tendinta de agravare<ul style="list-style-type: none">- episod nou (< 3 luni) de astenie persistenta,- febra de origine necunoscuta) <p><u>Nivel 2: Semi-urgent</u> <u>maxim 1 luna</u></p> • Afectiuni acute intercurente la pacienti cu patologii multiple cronice labile (de ex diabet, BPOC, astm)• Rezultate anormale semnificative ale testelor de laborator fara etiologie clinica clara (de ex VSH crescut in context de stare generala modificata, fara alte simptome)		trimestrial. 3.
--	--	--	--------------------

PACHET AMBULATOR

		<p>Nivel 3: Rutina maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afecțiuni cronice lent progressive • Entități nosologice multiple la un singur pacient (ex Sindromul X) Boli de sistem care necesita evaluare complexă: LED, Sarcoidoza, Hemocromatoza, etc 		
--	--	---	--	--

17. Nefrologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecvența/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¹Edeme periferice după excluderea ins cardiaice, hepatice, ins. Venoase cronice, la pacient cu hipoalbuminemie serică și proteinurie • ²Crestere rapidă a creatininei serice la pacient cu hematurie micro sau macroscopica 	<p>Pentru boala acută: 2 consultatii (1 consultatie initială, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronică: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

	<p>³eFG 15 -29 ml si dispnee, anemie, HTA. Dispnee, scadere ponderala, Hparatiroidism sau HKemie</p> <p><u>Nivel 2 - semiurgent Maxim 3 luni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ¹eFG 15 -29 ml la pacient cu boala renala cr. stabila, cu sau fara proteinurie• ²eFG 30 -44 ml la pacient cu HTA, proteinurie, anemie, nivel crescut PTH• ³eFG 45 -59 ml si val. crescute ale creatininei in mai mult de 2 ocazii, cu sau fara alte modificari urinare, in ciuda modificarii trat. medicamentos• ⁴HTA complicata sau necontrolata , mai ales la pacienti cu debut precoce al bolii, cu istoric familial de HTA complicata, cu coafectare renala sau sistemica <p>⁵Acidoza renala prin afectare tubulara, alcaloza metabolica cu hipoKemie, H/hCaemie, H/h naemie, H/hKemie</p>	
--	--	--

PACHET AMBULATOR

	<p>Nivel 2: de rutina Maxim 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none">• ¹Microalbuminuria la pacienti cu risc inalt• ²Afectare renala in boli ereditare• ³Oxaluria, Hparatiroidismul• ⁴Sfat privind medicatia curenta, echilibrul fluidelor etc <p><i>eFG se exprima in ml/min/1.73m²</i> <i>- declinul eFG cu < 4 ml/min/1.73m²</i> <i>indica o progresie lenta a bolii cronice renale</i> <i>- populatia cu risc inalt pt boala cronica renala cuprinde: V>60 ani, diabet, istoric familial de boala renala, cu boala cardiovasculara manifesta, cu HTA, fumatori</i></p>		
--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

18. Neurochirurgie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent Maxim 1 luna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hematom subdural cronic lent progresiv • TRat chir al tumorilor intracraiene • Nevralgia severa de trigemen care nu se amelioreaza la trat uzuale • Tratament de decompresie a unui nerv periferic, in caz de deficit neurologic semnificativ sau durere severa <p>Nivel 2:Semiurgentic Maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumori mici benigne intracraniale extrinseci de tip meningioame etc • TRat chirurgical al nevralgiei severe de trigemen • Tumori spinale cu deficit neurologic mic Sdr de entrapement al unor nervi periferici cu deficit neurologic progresiv <p>Nivel 3: de Rutina Maxim 6-12 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgia pentru tulburari de miscare • Afectari discale degenerative, prolapsul 	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

PACHET AMBULATOR

		<p>cervical si lombar cu deficit neurologic minim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stenoza de canal lombar cu afectare intermitenta a membrelor plevine <p>Sdr de compresie usoara de nervi periferici cu deficite neurologice minime (sdr de canal carpian, sdr de nerv ulnar, etc)</p>		
--	--	---	--	--

19. Neurologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent Maxim 1-2 saptamani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paralizia de orice cauza • Epilepsie necontrolata • Edem papilar sau afectare neurologica de focar, inclusiv afectare cognitive • Sdr de coada de cal • Vertijul fara alte simptomatologie neurologice <p>Nivel 2: 2-Semiurgent Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paralizia de orice cauza • Epilepsie necontrolata • Edem papilar sau afectare neurologica de focar, inclusiv 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	<p>* pentru pacientii diagnosticati cu I61 - AVC hemoragice - hemoragia intracerebrala si I63 - AVC ischemic (infarctul cerebral) consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: 4 consultatii in primul an, ulterior 2 consultatii/an.</p>

PACHET AMBULATOR

	<p>afectare cognitive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdr de coada de cal • Vertijul fara alte simpt. neurologice <p>Nivel 2: Semiurgent Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima criza epileptica Simptome suggestive pentru scleroza multipla, neuropatie, miopatie, boala de neuron motor etc <p>Nivel 3: de Rutina Maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demente • Sdr. Extrapiramidale • Ataxie • Tremor • Distrofii muscular si miopatii, neuropatii Situatii diagnosticate anterior – migrena, cefaleea cu suspiciune de leziune intracraniana, consulturi pentru a doua opinie 	
--	--	--

20. Neurologie pediatrică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
---------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------

PACHET AMBULATOR

1. consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control) Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	
-----------------------	----------------------------	--	--	--

21. Oncologie medicală

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea de cancer pulmonar, colonic, de san, limfoame, testicular etc • Pacientul cu chimio sau radioterapie care prezinta sepsis, neutropenie etc • Pacientul febril in cursul tratamentului • Complicatii severe gastrointestinal in cursul trataemntului • Chimioterapie paleativa <p>TRat chimioterapic adjuvant in unele forme de cancer</p> <p>Nivel 2: Semiurgent Maxim 3 luni</p> <p>Efecte secundare sau complicatii</p>	<i>Pentru boala oncologica activa maxim 6 consultatii/an.</i>	

PACHET AMBULATOR

		<p>minore Cancerul de prostata localizat</p> <p>Nivel 3 de Rutina Maxim 6 luni</p> <p>Cancerul de prostata localizat</p>		
--	--	---	--	--

22. Obstetrică-ginecologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1: Urgent maxim 14 zile</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sangerari postmenopauza •Suspiciune importanta de neoplazie genitala •Formatiuni pelviene cauzatoare de durere/presiune •Sangerare vaginala importanta insotita de anemie •Exacerbare a BIP Prolaps uterin grd IV ulcerat <p>Nivel 2: semiurgenta Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> •Test BPN HSIL CINII sau III •Chiste ovariene complexe > 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>50 ani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prolaps grd IV neulcerat • Menoragia cu sau fara fibrom <p>Surgeri persistente , coprpi straini, formatiuni palpabile</p> <p>Nivel 3: de rutina Maxim 3 luni</p>		
--	--	--	--	--

23. Oftalmologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1: Urgent Max 2 saptamani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detasarea de retina/hemoragia retiniana • Hemoragia de vitros • Maculopatie legata de varsta • Paralizii de NC, Glaucomul, Edemul discului • Retinopatie • Afectiuni maligne inaltaoculare 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

	<ul style="list-style-type: none">• Dacriocistita acuta <p><i>Nivel 2: Semiurgent Maxim 1 luna</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Strabism, tulburari de refractie la copii• Tumori benigne si cancere neprogresive• Maculopatie, hemoragia de vitros• Entropion, ectropion sever• Dacriocistita cronica• Proptozis, afectare ocular in Basedow• Cefalee cu simptome oculare <p><u>Nivel 3 - de rutina Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none">Pterigyum• Ectropion• Epifora• Monitorizarea de rutina – Ex FO• Miopia severa, hipermetropia	
--	---	--

PACHET AMBULATOR

24. Otorinolaringologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: Urgent maxim 2 saptamani</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surditatea subita • Vertijul sever periferic • Pareza faciala acut instalata (cu suspiciune de cauza otologica) • Apneea de somn (documentata) • Limfadenopatia cervicala ne-explicabila • Ulceratile orofaringiene • Fractura nazala necomplicata • Disfagia faringiana • Infectii acute persistente/ agravate sub tratament Angina insotita de simptome sugestive pentru MNI 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

	<p>Nivel 2: Semi-urgent <u>maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Obstructia nazala progresiva unilaterală• Tinnitus pulsatil cu aspect timpanic normal• Epistaxis minor recurrent• Durere faringiană persistență• Disfonia persistență/progresivă fără cauză aparentă• Hipoacuzie progresivă asimetrică• Epistaxis recurrentă în absența problemelor de coagulare• Otalgie severă persistență de cauză inaparentă• Durere facială atipică severă/persistență/fără cauză aparentă• Inflamație parotidiană persistență• Formațiuni cervicale cu caracter inflamator persistent• Formațiuni cervicale nedureroase persistente (> 3 săptămâni)	
--	--	--

PACHET AMBULATOR

	<p>Nivel 3: Rutina maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none">•Vertij episodic /persistent/•Otita medie secretoare recurenta/ simptome persistente•progresiv (insotit de hipoacuzie)•Tinnitus uni/bilateral asociat cu hipoacuzie/vertij/otore e•Amigdalite recurente (>6 episoade documentate in ultimele 12 luni sau 3 episoade/an ultimii 3 ani)•Hipoacuzia progresiva simetrica•Rinita cu simptome necontrolate care afecteaza calitatea vietii•Obstructia nazala persistenta fara cauza aparenta Sforaitul invalidant (cu probabilitate inalta de apnee de somn)	
--	--	--

PACHET AMBULATOR

25. Ortopedie și traumatologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent 2 saptamani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumori maligne primare sau metastatice • Tumori benigne • Fracturi care necesita monitorizare • Lezuni de tendon prezентate tardiv <p>Nivel 2 semiurgント maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proteze mobile, in lipsa de infectie la sold, genunchi • Sdr de coafa a rotatorilor • Sdr de entrapement ale unor nervi • Tendinopatii <p>Implanturile metalice devenite simptomatice</p>	<p>Pentru boala acuta: 4 consultatii standard B2, si 5 consultatii de tip A</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>Nivel de rutina Maxim 2-6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boala artrozica • Dupuytren • Cervicalgia si lombalgia cronica • Instabilitatea articulara cronica • Entezopatiile • Afectiuni ale piciorului <p>Genu valgus/varus</p>		
--	--	--	--	--

26. Ortopedie pediatrică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

27. Pediatrie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2</i>	

PACHET AMBULATOR

			<p><i>consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	
--	--	--	---	--

28. Pneumologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 urgent Maxim 1-2 saptamani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuberculoza pulmonara • Infectii severe la pacienti cu alte comorbiditati sau imunodeprimati • Fibroza chistica • AB cu stare agravata lent • BPOC complicat sever • Suspiciune de cancer pulmonar – hemoptizie recenta semnificativa, sdr 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

	<ul style="list-style-type: none">• de obstructive a VCS• Sdr de hipertensiune pulmonara• Fibroze pulmonare <p><u>Nivel 2: Semiurgent Maxim 1 luna</u></p> <p>Afectiunile anterioare dar cu severitate mai mica</p> <ul style="list-style-type: none">• Dispneea de etiologie incerta -• Afectarea respiratorie asociata cu alte comorbiditati• Suspiciunea de sarcoidoza• Sdr. de apnee de somn sever• Sdr restrictive la pacienti cu disfunctie musculara, toracica, reversat pleural important etc <p>Nodulul pulmonar</p> <p><u>Nivel 3: de Rutina Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sdr. de apnee de somn• BPOC sever• Astmul necontrolat /partial controlat in trepte terapeutice IV-V• Sdr. de tuse cronica• Contactii TB <p>Bronsiectaziile</p>		
--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

29. Psihiatrie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	<p>*in cazul pacientilor aflati in tratament cu medicamente in care medicul specialist psihiatru este unic prescriptor, nr. maxim de consultatii permis este in concordanta cu prevederile protocoalelor de prescriere.</p>

30. Psihiatrie pediatrică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

--	--	--	--	--

31. Reabilitare medicală*

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1.consultatie	*conform capitol definitii		<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	<p>Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <p>1.Infarct: 2. ACV</p>

*conform prevederilor ANEXEI - Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriu de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală

32. Reumatologie

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1.consultatie	*conform capitol definitii	<u>Nivel 1 Urgent Maxim 1-2 saptamani:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Arterita cu celule gigante • LES • PAR in puseu • POli/ Dermatomiozita 	<p>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</p>	

PACHET AMBULATOR

	<ul style="list-style-type: none">• Artite septice• Guta cu afectare poliarticulara <p><u>Nivel 2 Semiurgent Maxim 1-2 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Boli sistemice ale ţesutului conjunctiv (LES, Artita psoriazică, PAR, Sclerodermia, Sindrom Sjogren, etc)• Boala Paget a osului severă• Osteoporoză severă și simptomatică• Osteomalacia• Suspiciune de boala sistemica• Suspiciune de sdr. paraneoplazic• Pacienti cu comorbidități care sporesc nivelul de dependență• Pacienți având în grija un partener dependent Pacienți care nu mai pot continua activitatea în cîmpul muncii <p><u>Nivel 3 de Rutina Maxim 3 luni</u></p> <p>Artroze Reumatism abarticular (Epicondilite, sindrom de canal carpian, fasciita plantară etc)</p> <p>Sindrom cu durere cronică: Fibromialgia, Durerea lombară joasă cronică</p>	
--	---	--

PACHET AMBULATOR

33. Urologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: 1 Urgent Maxim 1 Luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea de leziune maligna: hematuria macroscopic la adulti, hematuria microscopica la adultii peste 50 de ani, • suspiciunea de cancer testicular (tumefiere testiculara), • suspiciunea de cancer penian, • suspiciunea de cancer renal (mase tumorale solide la ex radiologic), • suspiciunea de cancer prostatic (PSA > la barbati cu speranta de viata de peste 10 ani etc) • suspiciunea de cancer al vezicii urinare la persoane la risc • Obstructia renala Hematuria macroscopic nedureroasa <p><u>Nivel 2: Semiurgント Maxim 3 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afecțiuni cu durere care cedează la trat uzuale • Afecțiuni ce conduc la restrictionarea activității socio- 	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

PACHET AMBULATOR

		<p>economice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vezica neurogena <p>Nivel 3: de rutina maxim 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificari ale scrotului (varicocel, chist epididimiar, hidrocel etc) • Incontinenta urinara de effort sau mictiunile imperioase la femei • Tulburari mictionale de tip obstructive la barbat– adenomul prostatic Infectii urinare recurente 		
--	--	---	--	--

34. Chirurgie vasculară

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

PACHET AMBULATOR

35. Radioterapia*)

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii			
2. proceduri				

*se va realiza conform capitolului Imagistica

36. Chirurgie orală și maxilo-facială**))

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control) Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an	

*** se va realiza conform anexei servicii dentare

PACHET AMBULATOR

B. PROCEDURI DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE/EXPLORARI FUNCTIONALE

- C00701 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI SUPERFICIALI DE PE CORNEE
- C00702 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI INCLAVATI IN CORNEE CU MAGNET
- C01301 DEBRIDAREA EPITELIALA A CORNEEI
- C01302 EXCIZIA PTERIGION-ULUI
- C02001 COAGULAREA CU LASER A VASELOR SANGUINE SCLERALE
- C02201 EXCIZIA PINGUECULEI
- C07202 SECTIONAREA BLEFARORAFIEI
- C07401 EXCIZIA CHISTULUI TARSAL
- C08502 INCIZIA SACULUI LACRIMAL
- C09201 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI SUPERFICIALI DE PE CONJUNCTIVA
- C09202 INJECTIA SUBCONJUNCTIVALA
- C09302 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI INCLAVATI DE PE CONJUNCTIVA
- G02401 BRONHOSCOPIA
- G02403 FIBROBRONHOSCOPIA
- G02503 FIBROBRONHOSCOPIA CU BIOPSIE
- G03101 BIOPSIA PERCUTANATA (CU AC) A PLEUREI
- J00101 ESOFAGOSCOPIA FLEXIBILA
- J01202 ESOFAGOSCOPIA CU BIOPSIE
- J05401 SIGMOIDOSCOPIA RIGIDA
- J05502 COLONOSCOPIA FLEXIBILA PANA LA CEC
- J06103 COLONOSCOPIA FLEXIBILA PANA LA CEC, CU BIOPSIE
- J13901 ENDOSCOPIA PANA LA DUODEN
- J14201 ENDOSCOPIA PANA LA DUODEN CU BIOPSIE
- J14202 ENDOSCOPIA ILEALA CU BIOPSIE
- K04901 CISTOSCOPIA
- K05205 ASPIRATIA PERCUTANATA (CU AC) A VEZICII URINARE
- K07201 URETROSCOPIA

PACHET AMBULATOR

- K08201 DILATAREA URETRALA CU BUJII
K08202 DILATAREA STRICTURIOR URETRALE
L01603 SUTURA LACERATIILOR SCROTULUI SAU ALE TUNICII VAGINALE
M03601 DISTRUCTIE CU LASER DE LEZIUNE A COLULUI UTERIN
M03602 CAUTERIZARE DE COL UTERIN
M03604 DIATERMOCOAGULAREA COLULUI UTERIN
M03701 BIOPSIA DE COL UTERIN
M03702 POLIPECTOMIA LA NIVELUL COLULUI UTERIN
M03706 CONIZATIA DE COL UTERIN PRIN LASER
M04001 VAGINOSCOPIA
M04002 COLPOSCOPIA
M04201 DISTRUCTIA DE PAPILOM VAGINAL
M04302 BIOPSIA DE VAGIN
M05001 DISTRUCTIA DE PAPILOM VULVAR
M05101 TRATAMENTUL ABCESULUI GLANDEI BARTHOLIN
N00101 AMNIOCENTEZA DIAGNOSTICA
N00102 BIOPSIE DE VILI CORIONICI
003801 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CLAVICULA
003901 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE CLAVICULA
003903 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE UMAR
004401 IMOBILIZAREA FRACTURII DE HUMERUS PROXIMAL
004402 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA HUMERALA
004403 IMOBILIZAREA FRACTURII DE HUMERUS DISTAL
004901 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE HUMERUS PROXIMAL
004903 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA HUMERALA
004905 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE HUMERUS DISTAL
005101 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE COT
005103 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ARTICULATIE RADIO-ULNARA PROXIMALA
005601 IMOBILIZAREA FRACTURII DE EPIFIZA DISTALA DE RADIUS
005602 IMOBILIZAREA FRACTURII ULNARE DISTALE
005603 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS
005604 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA ULNARA

PACHET AMBULATOR

- 005605 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS SI ULNARA
006101 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE EPIFIZA DISTALA DE RADIUS
006103 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS
006105 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS CU LUXATIE
006107 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CAP SAU COLET AL RADIUSULUI
006201 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE EPIFIZA DISTALA ULNARA
006203 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA ULNARA
006205 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA ULNARA CU LUXATIE
006207 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE OLECRAN
006701 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ARTICULATIE RADIO-ULNARA DISTALA
010805 IMOBILIZAREA LUXATIEI DE SOLD
011805 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE FEMUR
011901 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE SOLD
012601 IMOBILIZAREA FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SAU LATERAL
012602 IMOBILIZAREA FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SI LATERAL
012603 IMOBILIZAREA GIPSATA A FRACTURII DIAFIZARE DE TIBIE
012604 IMOBILIZAREA FRACTURII DE PERONEU
012605 IMOBILIZAREA FRACTURII DE ROTULA
013701 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE GENUNCHI
013702 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ROTULA
013801 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SAU LATERAL
013803 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SI LATERAL
014001 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA TIBIALA
014002 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA TIBIALA CU FIXARE INTERNA
014004 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII INTRA-ARTICULARE DE DIAFIZA TIBIALA
015602 IMOBILIZAREA FRACTURII DE CALCANEU
015603 IMOBILIZAREA LUXATIEI DE CALCANEU
015604 IMOBILIZAREA FRACTURII DE ASTRAGAL
015605 IMOBILIZAREA LUXATIEI DE ASTRAGAL
015606 IMOBILIZAREA FRACTURII DE TARS
015607 IMOBILIZAREA FRACTURII DE METATARS
015608 IMOBILIZAREA TENDONULUI ACHILLIAN

PACHET AMBULATOR

- O16501 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CALCANEU
O16503 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE ASTRAGAL
O16505 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII INTRA-ARTICULARE DE CALCANEU
O16507 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII INTRA-ARTICULARE DE ASTRAGAL
O16509 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE ARTICULATIE TARSOMETatarsiana
O16511 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE METATARS
O16601 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE GLEZNA
O16604 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE FALANGA A HALUCELUI
O16606 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE FALANGA A DEGETULUI PICIORULUI, ALTUL DECAT HALUCELE
O16901 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE GLEZNA
O16903 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE DEGET AL PICIORULUI
O16905 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ASTRAGAL
O16907 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE CALCANEU
O16909 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CALCANEU CU LUXATIE
O16911 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE ASTRAGAL CU LUXATIE
O17501 CORECTIA PICIORULUI EQUINOVARUS, UNILATERAL
O17504 CORECTIA PICIORULUI EQUINOVARUS, BILATERAL
O17903 INJECTAREA IN LIGAMENT, TENDON SAU PARTI MOI
P01001 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOLETE A (PUVA) A ALTOR ZONE
P01002 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOlete A (PUVA) A MAINII
P01003 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOlete A (PUVA) A PICIORULUI
P01004 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOlete A (PUVA) A MAINII SI PICIORULUI
P01101 TERAPIA CU ULTRAVIOlete B IN ALTE ZONE
P01303 CHIURETAJUL LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNE UNICA
P01304 CHIURETAJUL LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNI MULTIPLE
P01309 ELECTROTERAPIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNE UNICA
P01310 ELECTROTERAPIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNI MULTIPLE
P01701 BIOPSIA TEGUMENTULUI SI TESUTULUI SUBCUTANAT
P01803 INDEPARTAREA MOLUSCUM-ULUI CONTAGIOSUM
S02602 MASURAREA TONUSULUI MUSCHILOR RESPIRATORI LA DIVERSE VOLUME PULMONARE
S02603 MASURAREA REZISTENȚEI SAU FATIGABILITATII MUSCHILOR RESPIRATORI
S02701 TESTUL DE EFORT PENTRU EVALUAREA FUNCTIEI RESPIRATORII

PACHET AMBULATOR

- S02702 SPIROMETRIE DE EFFORT
S02806 MASURAREA SCHIMBULUI DE GAZE
S02807 MASURAREA CAPACITATII DE DIFUZIE A MONOXIDULUI DE CARBON
S02808 MASURARE VOLUMULUI PULMONAR TOTAL
S02809 MASURAREA REZISTENȚEI CAILOR AERIENE SAU PULMONARE
S02813 TESTE DE PROVOCARE INHALATORII
S02904 MONORIZAREA PRESIUNII ARTERIALE SISTEMICE
S03202 INREGISTRARE ECG CONTINUA AMBULATORIE, HOLTER
S03401 ALT TIP DE ELECTROCARDIOGRAFIE [ECG]
S03404 INREGISTRAREA ECG A SEMNALULUI MEDIAT
S03502 TESTAREA PACEMAKER-ULUI IMPLANTAT SECVENTIAL ATRIOVENTRICULAR [AV]
S03503 TESTAREA PACEMAKER-ULUI IMPLANTAT CU RASPUNS LEGAT DE FRECVENTA CARDIACA
S03504 TESTAREA PACEMAKER-ULUI IMPLANTAT ANTITAHARITMIE
S03602 TESTUL DE EFORT CARDIOVASCULAR
S03604 TESTUL DE INCLINATIE (PENTRU SINCPA VASO-VAGALA)
S04101 DEBITMETRIA URINARA
S07904 INSERTIA ALTUI PESAR VAGINAL
S07911 INDEPARTAREA ALTUI PESAR VAGINAL
S07913 INDEPARTAREA ALTOR DISPOZITIVE DIN TRACTUL GENITAL

C. INVESTIGATII PARACLINICE AMBULATORII

1	Hemoleucograma completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari inclusiv VSH
2	Examen citologic al frotiului sangvin
3	Determinare ABO + Rh la gravida

PACHET AMBULATOR

4	Determinare Izo Rh (Anti Rh) la gravida
5	Oricare dintre: Timp Quick, protrombina (inclusiv INR) sau APTT sau Timp trombina sau fibrinogen sau orice produs degradare fibrinogen sau D-dimeri
6	2 teste din cele de mai sus
7	3 teste
8	4 sau mai multe teste
9	Oricare din: uree serica sau urinara, acid uric seric sau urinar, creatinina serica sau urinara, calciu seric total, magneziemie, glicemie, glucoza urinara, colesterol seric total, trigliceride serice, proteine totale serice sau urinare, bilirubina sau alta fractiune a acesteia, proteina C reactiva, gamma GT, TGO, TGP, sodiu, potasiu, albumina
10	2 teste din cele de mai sus
11	3 teste
12	4 teste
13	5 sau mai multe teste
14	HDL colesterol
15	LDL colesterol
16	Calciu ionic seric
17	Sideremie
18	Electroforeza proteinelor serice
19	Fosfatază alcalină

PACHET AMBULATOR

20	LDH
21	Creatinkinaza (CK)
24	Hemoglobina glicată
25	Cetonurie
26	Clearence creatinină
27	Microalbuminurie
28	Rata filtrării glomerulare
29	Osmolaritate serică
30	Osmolaritate urinară
31	Determinarea cantitativă a oricare din: Alpha-fetoproteina, Antigen CA-15.3 (CA15.3), Antigen CA-125 (CA125), Antigen CA-19.9 (CA19.9), Tiroglobulina serică, PSA, free-PSA
32	2 sau mai multe teste
33	Dozare sange sau urină a oricare dintre: TSH, FT4, aldosteron, cortizol, FSH, hormon de creștere, LH, estradiol, estrogen, progesteron, prolactina, PTH, renina, somatomedina C (IGF-1), testosteron
34	2 teste din cele de mai sus
35	3 teste
36	4 teste
37	

PACHET AMBULATOR

38	Examen microscopic si cultura din oricare: urina, sputa, secretii vaginala, uretrala, faringe, otice, nazale, conjunctivale, puroi
39	Antibiograma
40	Examen Babeș-Papanicolau*1)
41	Examen coproparazitologic (3 probe)*1)
42	Coprocultură*1)
43	Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
44	ASLO*1)
45	Testare HIV la gravidă*1)
46	Anti HCV*2)
47	Ag HBs (screening)*2)
48	Anti-HAV IgM*2)
49	Oricare dintre: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE seric
50	2 teste din cele de mai sus
51	3 sau mai multe teste
52	Complement seric C3 si C4
53	Factor rheumatoid
54	VDRL*1)
55	RPR*1)

PACHET AMBULATOR

56	Confirmare TPHA*1), *4)
57	Depistare Helicobacter Pylori
58	Anticorpi anticardiolipinici IgG, IgM
59	Anticorpi antinucleari (ANA) -screening
60	Anticorpi anti-LKM1
61	Anticorpi anti-peptidul citrulinat ciclic (Anticorpi anti-CCP)
62	Ag HBe
63	Anti- Hbe
64	Anti-HBc
65	Test de toleranta orala la glucoza
66	Examen lichid punctie
67	Examen microscopic/frotiu
68	Cultură
69	Antibiograma
70	Examen microscopic si cultura din oricare: urina, sputa, secretie vaginala, secretie uretrala, otica, nazala, conjunctivala, puroi
71	Examinări histopatologice
72	Biopsii/piese chirurgicale - procesare si diagnostic histopatologic (coloratie H&E)
73	- 1-3 blocuri de parafina

PACHET AMBULATOR

74	- 4-10 blocuri de parafina
75	- 11-20 blocuri de parafina
76	- >20 blocuri de parafina
77	Examen histopatologic cu colorații speciale
78	Teste imunohistochimice (IHC)
79	Examen citopatologic
80	- examen Babes-Papanicolau din secreție vaginală
81	- examen citopatologic din lichide biologice
82	Test HER2 CISH pentru cancerul de san

PACHET AMBULATOR

D. IMAGISTICA MEDICALA

Problema clinica	Investigatie (doza)	Nivel de recomandare
A. Craniul (inclusiv problemele ORL)		
Tulburari congenitale <i>(Pentru copii vezi sectiunea M)</i>	RMN (0)	Indicat (C)
Accident vascular cerebral (AVC) A1	CT (II) RMN (0) si MN (II) US carotide (0)	Indicat (C) Investigatie specializata (B) Nu e indicat de rutina (C)
Atac ischemic tranzitor (AIT) <i>(vezi si B5)</i>	US carotide (0)	Indicat (B)
Demielinizarea si alte boli ale substantei albe A2	RMN (0)	Indicat (A)
Leziune cerebrală înlocuitoare de spatiu (SOL) A3	CT (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
Cefalee: acuta, severa A4	CT (II)	Indicat (B)
	RMN (0) sau MN (II)	Investigatie specializata (C)
Cefalee cronica <i>(Pentru copii vezi sectiunea M)</i>	RX craniu, sinus, coloana C (I) CT (II) sau RMN (0)	Nu e indicat de rutina (B) Nu e indicat de rutina (B)
Probleme hipofizare si paraselare	RMN (0)	Investigatie specializata (B)

PACHET AMBULATOR

A8	RXS (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Semne de fosa cerebrală posterioara A9	RMN (0)	Indicat (A)
Hidrocefalie	CT (II)	Indicat (B)
(pentru copii vezi Secțiunea M)		
A10	RX	Indicat (C)
Simptome ureche medie sau internă (inclusiv vertijul) A11	CT (II)	Investigație specializată (B)
Surditate neurosenzorială (pentru copii vezi Secțiunea M)	RMN (0)	Investigație specializată (B)
A12		
Sinuzita	RX sinusala (I)	Nu e indicat de rutina (B)
(pentru copii vezi Secțiunea M)	CT (II)	Investigație specializată (B)
A13		
Dementă și tulburări de memorie, psihoză la debut A14	RXS (I) CT (II) sau RMN (0) sau MN (III)	Nu e indicat de rutina (B) Investigație specializată (B)
Leziuni orbitale A15	CT (II) sau RMN (0)	Investigație specializată (B)
Orbite - Corp stran metalic (înaintea RMN) A16	RX orbite (I)	Indicat (B)
Tulburări vizuale	RXS (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Epilepsie (adult)	RXS (I)	Nu e indicat de rutina (B)
(pentru copii vezi Secțiunea M)		
A18	CT (II), RMN (0) sau MN (III)	Investigație specializată (B)

PACHET AMBULATOR

B. Gâtul (pentru coloana, vezi Sectiunile C – Coloana si K - Trauma		
Tesuturi moi		
Noduli tiroidieni si hipertiroidism B1	US (0) si MN (I)	Indicat (B)
Tirotoxicoza B2	MN (I), US (0)	Indicat (B)
Tesut tiroidian ectopic (ex. tiroïda linguală) B3	MN (I)	Indicat (C)
Hiperparatiroidism B4	Imagistica	Investigatie specializata (C)
Suflu carotidian asimptomatic B5	US carotidian (0)	Nu e indicat de rutina (B)
Corp strain inghitit sau inhalat B6		
Masa de origine necunoscută B7	US (0)	Indicat (C)
Obstructie salivara B8	US (0) sau sialografia (II)	Indicat (C)
Masa la nivelul glandelor salivare B9	RX	Nu e indicat de rutina (C)
Uscaciunea mucoasei bucale – boala de tesut conjunctiv B10	US (0) sau sialografia (II) sau MN (II)	Investigatie specializata (C)
Disfunctia articulatiei temporomandibulare	RX (I)	Investigatie specializata (B)
	RMN (0) sau	Investigatie specializata (B)

PACHET AMBULATOR

	B11	artroghrafie (II)	
C. Coloana vertebrală			
Partea generală (pentru traume, vezi Secțiunea K)			
Boli congenitale		RX (I)	Investigație specializată (C)
<i>(pentru copii vezi Secțiunea M)</i>	C1	RMN (0)	Investigație specializată (B)
Mielopatie: tumori, inflamatie, infectie, infarct	C2	RMN (0)	Indicat (B)
Coloana cervicală			
Subluxatia atlanto-axiala	C3	RX (I)	Indicat (C)
Cervicalgie, brahialgie, modificare degenerativa	C4	RX (I)	Nu e indicat de rutina (B)
		RMN (I)	Investigație specializată (B)
Coloana toracica			
Durere fara trauma: boala degenerativa		RX (I)	Nu e indicat de rutina (B)
	C5	RMN (0)	Investigație specializată (B)
Coloana lombara			
Durere lombara cronica fara semnne de infectie sau tumoră (lombalgie)		RX (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	C6	RMN (0) sau CT (II) sau MN (II)	Investigație specializată (C)

PACHET AMBULATOR

Lombalgie cu posibile caracteristici severe ca: <ul style="list-style-type: none"> • debut la <20 ani, >55 ani • sfincter sau mers • sindromul cozii de cal (sfincter sau mers) • deficit senzitiv muscular • pierdere motorie severa sau progresiva • deficit neurologic extins • carcinom in antecedente • rau sistematic • HIV • scadere in greutate • abuz droguri intraveneoase • corticiterapie, steroizi • deformitate structurala • durere non-mecanica <p style="text-align: center;">C7</p>	Imagistica	Indicat (B)
Lombalgie acuta: herniera discului; sciatica fara caracteristici adverse (vezi mai sus)	RX (II)	Nu e indicat de rutina (C)
C8	RMN (0) sau CT (II)	Nu se indica initial (B)
D. SISTEMUL LOCOMOTOR		
Osteomielita	RX (I) + MN (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
D1	CT(II) sau US (0)	Investigatie specializata (C)
Tumora osoasa primara	RX (I)	Indicat (B)
D2	RMN (0) sau CT (II)	Investigatie specializata (B)
Tumora primara cunoscuta. Metastaze osoase	MN (II)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

	Examinare osoasa (II)	Nu e indicat de rutina (C)
D3	RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Masa tumorala de parti moi	RMN (0)	Indicat (B)
D4		
Durere osoasa	RX (I)	Indicat (B)
D5	MN (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
Mielom	Examinare osoasa (II)	Indicat (C)
	MN (II)	Nu e indicat de rutina (B)
D6	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Boala osoasa metabolica	Examinare osoasa (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	MN (II)	Indicat (C)
Osteomalacia	RX (0)	Indicat (B)
D7		
D8	MN (II)	Specializata
Durere – colaps osteoporotic	RX (II) toracic lateral si coloana lombar	Indicat (B)
D9		
Artropatie, prezentare	RX (I) articulatie afectata	Indicat (C)
	RX (I) maini/picioare	Indicat (C)
	RX (II) multiarticular	Nu e indicat de rutina (C)
D10	US (0) sau MN (II) sau RMN (0)	Investigatii specializate (B)
Artropatie, urmarire	RX (I)	Nu e indicat de rutina (C)
D11		
Articulatia umarului dureroasa (umarul dureros)	RX (I)	Nu e indicat initial (C)
D12		
Proteza dureroasa	RX (I) + MN (II)	Indicat (B)
	US (0) sau fluoroscopie (II)	Investigatie specializata (C)

PACHET AMBULATOR

	D13		
Sindromul de impingement al umarului		RMN (0)	Investigatie specializata (B)
	D14	US (0)	Investigatie specializata (B)
Instabilitatea umarului		Artrografie CT (II)	Investigatie specializata (B)
	D15	Artrografie RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Leziuni ale muschilor rotatori	D16	Artrografie (II) sau US (0) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Leziunea articulatiei sacroiliace (SI)		RX (II) la articulatiile SI	Indicat (B)
	D17	RMN (0) sau MN (II) sau CT (II)	Investigatie specializata (C)
Dureri de sold: miscare completa <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i>	D18	RX pelvis (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Dureri de sold: miscari limitate <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i>	D19	RX pelvis (I)	Nu e indicat initial (C)
Durere coxofemurala: necroza avasculara		RX pelvis (I)	Indicat (B)
	D20	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Durere de genunchi (gonalgia): fara blocaj sau limitare a miscarii	D21	RX (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Durere de genunchi (gonalgia): cu blocaje, limitarea miscarii sau efuziune (pierdere articulara)	D22	RX (I)	Indicat (C)
Durere de genunchi (gonalgia): se are in vedere artroscopia	D23	RMN (0)	Investigatie specializata (B)

PACHET AMBULATOR

Monturi (haluce valg)	RX (I)	Investigatie specializata (C)
D24		
Fasceita plantara – „pinteni” calcaneeni (talalgia)	RX (I)	Nu e indicat de rutina (B)
D25		

E. Sistemul cardiovascular

Sindrom coronarian (durere in piept centrala) infarct miocardic	RXC (I)	Indicat (B)
E1		
Sindrom coronarian acut: disectie aortica	RXC (I)	Indicat (B)
E2	CT (III) sau US (0) sau RMN (0)	Indicat (B)
Sindrom coronarian cronic: disectie de aortica	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
E3		
Embolie pulmonara	MN (II) sau CT (III)	Indicat (B)
E4		
Pericardita – efuziunea pericardica	RXC (I)	Indicat (B)
E5	US (0)	Indicat (B)
Suspiciune de valvulopatie	RXC (I) si US (0) cardiac	Indicat (B)
E6		
Deteriorare clinica in urma infarctului miocardic	US (0) cardiac	Indicat (B)
E7		
Urmareala pacientilor cu cardiopatie sau hipertensiune	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (B)
E8		
Anevrism de aorta abdominala	US (0) aorta	Indicat (A)

PACHET AMBULATOR

E9	CT (III) sau RMN (0)	Indicat (A)
Tromboza venoasa profunda	US (0) vene membre inferioare	Indicat (A)
E10	Venografie (II)	Nu e indicat de rutina (C)
Ischemie membre inferioare	Angiografie (III)	Investigatie specializata (A)
E11		
Evaluare miocardica	MN (III)	Indicat (A)
E12		

F. Sistemul toracic

Durere toracica nespecifica F1	RXC (I)	Nu e indicat initial (C)
Traumatism toracic F2	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Control medical inaintea angajarii sau screening-uri medicale F3	RXC (I)	Nu e indicat
Pre-operator F4	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Infectie de tract respirator superior F5	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Boala respiratorie obstructiva cronica sau astm; urmarire F6	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Pneumonia adultului: urmarire (pentru copii, vezi Sectiunea M) F7	RXC (I)	Indicat (A)
Epansament pleural	RXC (I)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

F8	US (0)	Indicat (B)
Hemoptizie	RXC (I)	Indicat (B)
F9	CT (III)	Investigatie specializata (B)
Pacienti in unitati de terapie intensiva, hemodializa	RXC (I)	Indicat (B)
F10		
Afectiune pulmonara oculta	CT (II)	Indicat (B)
F11	MN (II)	Investigatie specializata (B)

G. Sistemul gastrointestinal

Tractul digestiv

Disfagie (dificultatea la inghitire)	Examen baritat (II)	Indicat (B)
G1	MN (I)	Investigatie specializata (B)
Durere toracica – hernie hialala sau reflux gastroesofagian	Examen baritat (III) / masa	Nu e indicat de rutina (C)
G2		
Perforatie esofagiana	RXC (I)	Indicat (B)
G3	Examen esofagian cu contrast hidrosolubil (II)	Investigatie specializata (B)
Sangerare gastrointestinala acuta: hematemeza, melena	RXA (II)	Nu e indicat de rutina (B)
	Examene baritate (II)	Nu e indicat de rutina (A)
	MN (II) (examinare celule rosii)	Investigatie specializata (B)
G4	Angiografia (III)	Investigatie specializata (B)
Dispepsia la pacientul mai tanar (<45 ani)	Imagistica (tranzit baritat (II)/	Nu e indicat de rutina (C)

PACHET AMBULATOR

	G5	Endoscopie (0))	
Dispepsia la pacientul mai in varsta (>45 ani)		Imagistica (tranzit baritat (II)/ Endoscopie (0))	Indicat (C)
	G6		
Urmarirea ulcerului	G7	Ex. baritat (II)	Nu e indicat de rutina (B)
Interventie chirurgicala gastro-intestinala superioara in antecedente (recent)	G8	Examen digestiv cu produs de contrast hidrosolubil (II)	Indicat (B)
Interventie chirurgicala gastro-intestinala superioara anteroioara (veche)		Ex. baritat (II)	Nu e indicat de rutina (B)
	G9	MN (II)	Investigatie specializata (B)
Sangerare intestinala cronica sau recurrenta		Examen baritat intestin subtire (II)	Nu e indicat initial (C)
	G10	MN (II) (celule rosii sau ex. Meckel) si/sau angiografie (II)	Investigatie specializata (C)
Durere abdominala acuta – perforare – obstructie		RXC (I) (vert.) si RXA (II)	Indicat (B)
	G11	CT (II)	Investigatie specializata (B)
Ocluzia intestinului subtire	G12	Examinari de contrast (II) sau CT (III)	Investigatie specializata (B)
Ocluzia cronica sau recurrenta a intestinului subtire	G13	Examen baritat intestin subtire (II)	Indicat (B)
Boli ale intestinului subtire suspectate (ex. boala Crohn)		Examen baritat intestin subtire (II)	Indicat (C)
		MN (examinarea celulelor albe) (III)	Investigatie specializata (B)

PACHET AMBULATOR

G14		
Tumora intestinului gros sau boala inflamatorie intestinala: durere, sangerare, modificare de tranzit intestinal	Enema (III)	Investigatie specializata (B)
G16		
Boli intestinale inflamatorii, de colon	RXA (II)	Indicat (B)
	MN (examinare leucocite) (III)	Indicat (B)
G17		
Urmarirea pe termen lung a unei boli intestinale inflamatorii, de colon	Enema baritata (III)	Nu e indicat de rutina (B)
G18		
Probleme abdominale generale		
Durere abdominala acuta (suficient de puternica pentru justificarea internarii in spital si luarea in considerare a interventiei chirurgicale)	RXA (II) plus RXC vert. (I)	Indicat (B)
G19		
Masa palpabila abdominala	RXA (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	US (0)	Indicat (B)
G20		
Malabsorbtie	Examinarea cu bariu a intestinului subtire (II)	Nu e indicat de rutina (B)
	MN (I)	Investigatie specializata (B)
G21		
Apendicita	Imagistica	Investigatie specializata (C)
G22		
Constipatie <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i>	RXA (II)	Nu e indicat de rutina (C)

PACHET AMBULATOR

	G23		
Sepsis abdominal; pirexie de origine necunoscuta (PON)		US (0) sau CT (III) sau MN (III)	Indicat (C)
	G24		
Metastaze hepatice		US (0) CT (II) sau RMN (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
	G25		
Hemangiom hepatic (evidentiat ecografic)		RMN (0) sau CT (III)	Indicat (B)
	G26		
		MN (examinare celule rosii) (III)	Investigatie specializata (B)
Icter		US (0)	Indicat (B)
	G27		
Patologie biliara (ex. calculi)		RXA (II)	Nu e indicat de rutina (C)
		US (0)	Indicat (B)
	G28		
		NM (II)	Investigatie specializata (B)
Pancreatita acuta		RXA (II)	Nu e indicat de rutina (C)
		US (0)	Indicat (B)
	G29		
		CT (III) sau RMN (0)	Nu e indicat de rutina (B)
Pancreatita cronica		RXA (II)	Indicat (B)
		US (0) sau CT (IV)	Indicat (B)
	G30		
		ERCP (II) sau MRCP (0)	Investigatie specializata (C)
Scurgeri biliare post-operatorii		MN (II)	Indicat (C)
	G31		

PACHET AMBULATOR

Tumora pancreatică G32	US (0) CT (III) sau RMN (0)	Indicat (B)
Insulinom G33	Imagistica	Specializat
H. Sistemul uro-genital si glande suprarenale		
Hematuria macroscopica sau microscopica H1	US (0) + RXA (II) sau IVU (II)	Nu e indicat de rutina (B)
Hipertensiunea arteriala (fara boala renala dovedita) H2	IVU (II)	Nu e indicat de rutina (A)
Hipertensiunea arteriala: la adultii tineri sau pacientii care nu raspund la tratamentul medical	US (0) rinichi MN (II) urografie	Indicat (B) Indicat (B)
 H3	Angiografie (DSA (III), CTA (III) sau Angiografie RMN (0))	Investigatie specializata (C)
Insuficienta renala H4	US (0) + RXA (II) MN (II)	Indicat (B) Indicat (B)
Colica renala, durere lombara H5	IVU (II) sau US (0) si RXA (II) sau CT (III)	Indicat (B)
Calculi renali (in absenta colicii acute) H6	US (0) + RXA (II)	Indicat (C)
Masa tumorala renala H7	US (0)	Indicat (B)
Afectarea prostatei	RXA (II) + IVU (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	US (0) IVU (II)	Indicat (B) Nu e indicat de rutina (B)

PACHET AMBULATOR

	H8		
Afectare maligna a prostatei	H9	US (0)	Investigatie specializata (B)
Retentie de urina	H10	US (0) IVU (II)	Indicat (C) Nu e indicat de rutina (B)
Masa sau durere scrotala	H11	US (0)	Indicat (B)
Torsiune testiculara (de cordon spermatic)		US (0)	Investigatie specializata (C)
	H12	MN (II)	Investigatie specializata (C)
Infectiile de tract urinar la adulti <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i>	H13	US (0) + RXA (II) sau IVU (II)	Nu e indicat de rutina (C)
Tumori medulo-suprarenale		CT (III) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)
	H14	MN (II)	Investigatie specializata (B)
Lezuni corticale suprarenale, boala si sindromul Cushing si Conn	H15	CT (III), MN (IV) Sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)

I. Obstetrica si ginecologie

NB: este necesar ca echipamentele de ecografie transvaginala (US TV) sa fie disponibile in toate sectiile ce realizeaza US pelvin

Depistare (screening) in timpul sarcinii	I1	US (0)	Indicat (C)
Sarcina	I2	US (0)	Nu e indicat de rutina (C)
Suspiciune de sarcina extrauterina	I3	US (0)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

Posibilitate de sarcina nonviabila I4	US (0)	Indicat (C)
Masa pelvina suspectata I5	US (0)	Indicat (C)
Dureri pelvine, inclusiv suspiciune de boala inflamatorie pelvina si de endometrioza I6	US (0)	Indicat (C)
Pierdere dispozitiv intrauterin (DIU) I7	RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Pierdere dispozitiv intrauterin (DIU) I7	US (0)	Indicat (C)
Avorturi spontane multiple (pierderi de sarcina recurente) I8	RXA (II)	Investigatie specializata (C)
Avorturi spontane multiple (pierderi de sarcina recurente) I8	RMN (0)	Indicat (C)
Infertilitate feminina I9	US (0)	Investigatie specializata (C)
Suspiciune de disproportie cefalo-pelvina I10	RX (II) Pelvimetrie RMN (0) sau CT (II)	Nu e indicat de rutina (B) Investigatie specializata (C)
J. Bolile sanului		
Paciente asimptomatice		
Depistare (screening de san) J1-4	Mamografie (I)	Indicatii numeroase
Istoric familial de cancer de san J5	Mamografie (I)	Examinare specializata (C)

PACHET AMBULATOR

Femei <50 ani cu tratament hormonal substitutiv (THSH), sau pentru care se vizeaza aceasta J6	Mamografie (I)	Nu e indicat de rutina (A)
Femei asimptomatice cu mamoplastie de augmentare J7	Mamografie (I)	
Paciente simptomatic		
Suspiciune clinica de cancer de san (diagnostic)	Mamografie (I), US (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
J8	MN (III) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Durere, tensiune sau sensibilitate mamara generalizata, sau ombilicare veche a mamei	Mamografie (I) sau US (0)	Nu e indicat de rutina (C)
J9		
Mastodinii ciclice	Mamografie (I)	Nu e indicat de rutina (B)
J10		
Mamoplastie de augmentare	US (0)	Indicat (B)
J11	RMN (0) sau MN (III)	Investigatie specializata (B)
Boala mamara Paget	Mamografie (I)	Indicat (C)
J12		
Inflamatia sanului	US (0)	Indicat (B)
J13		
Cancerul de san Stadiu: axila (ganglioni)	MN san/axila san axila (III)	Investigatie specializata (C)
Stadiu: general	MN scheletal (II)	Indicat (B)
J14	US ficat (0)	Nu e indicat de rutina (C)
Urmareala (supravegherea) cancerului de san	Mamografie (I)	Indicat (A)
J15		

PACHET AMBULATOR

K. Traume			
Craniu: general			
Craniu: risc redus de traumatism intracranian			
<ul style="list-style-type: none"> • orientat complet • fara amnezie • fara afectari neurologice • fara afectarea grava a scalpului • fara hemoatoame 	K1	RXS (I) CT (II)	Nu e indicat de rutina (C) Nu e indicat de rutina (C)
Craniu: risc mediu de traumatism intracranian			
<ul style="list-style-type: none"> • Pierdere cunoștinței sau amnezie • Mecanisme violente de traumatism • Contuzie scalp, tumefactie sau tăietura până la os sau >5 cm • Simptome sau semne neurologice (durere de cap, vomitat de minimum 2 ori, revenire la medic) • Istoric sau examinare inadecvată (epilepsie / c.s.alcool / copil etc.) • Copil <5 ani: traumatism nonaccidental suspectat, fontanelă tensionată, căzută de la >60 cm sau pe suprafață dură 	K2	CT (II) sau RXS (I)	Indicat (B)
Craniu: risc înalt de traumatism intracranian			
<ul style="list-style-type: none"> • Suspectare de corp străin sau traumatism craniian penetrant • Conștiință redusă sau dezorientare • Simptome sau semne neurologice focale • Convulsii • Fractură craniiană sau diastază suturală indicată de RXS • Sindrom de oboselă cronică de la nas sau SOC/ sangerare din ureche • Stare sistemnică instabilă impiedicând transferul în 		CT (II)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

sectia neurologie • Diagnostic incert	K3		
Craniu: risc foarte inalt de traumatism intracranian			
• Deteriorarea constientei sau semne neurologice (ex. modificari pupila) • Confuzie sau coma persistenta in pofida resuscitarii • Fontanela tensionata sau diastaza suturala • Traumatism deschis sau penetrant • Fractura craniana cu infundare sau cominutiva • Fractura de baza de craniu	K4	CT (II)	Indicat (B)
Trauma nazala	K5	RXS (I) RX osatura faciala (I), RX osatura nazala (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Trauma orbitala: traumatism provocat de obiect contondent	K6	RX osatura faciala (I)	Indicat (B)
Trauma orbitala: traumatism penetrant		RX orbite (I)	Indicat (C)
	K7	US (O) sau CT (II)	Investigatie specializata (B)
Trauma faciala la nivelul treimeii mijlocii a fetei		RX osatura faciala (I)	Indicat (B)
	K8	CT cu doza redusa de expunere la radiatie(II)	Investigatie specializata (B)
Trauma mandibulara	K9	RX mandibula (I) sau ortopantomograma (OPG) (I)	Indicat (C)
Coloana cervicala			
Pacient constient care prezinta numai leziune/traumatism cranian si/sau facial		RXC coloana (I)	Nu e indicat de rutina (C)

PACHET AMBULATOR

	K10		
Trauma craniana cu stare de inconstienta (vezi K3/4)	RXC coloana (I)	Indicat (B)	
K11			
Leziune in zona gatului: cu durere	RXC coloana (I)	Indicat (B)	
K12	CT (II) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)	
Leziune in zona gatului: cu deficit neurologic	RX (I)	Indicat (B)	
K13	RMN (0)	Indicat (B)	
Leziune in zona gatului: cu durere dar RX initial normal; lezuni ligamentare suspectate	RXC coloana; flexare si extensie (I)	Investigatie specializata (B)	
K14			
Coloana toracica si lombara			
Trauma: fara durere, fara deficit neurologic	RX (II)	Nu e indicat de rutina (B)	
K15			
Trauma: cu durere, fara deficit neurologic, sau pacientul nu este apt sa fie evaluat	RX in zona dureroasa (II)	Indicat (B)	
K16			
Trauma: cu deficit neurologic – durere	RX (II)	Indicat (B)	
K17	RMN (0)	Indicat (B)	
Pelvis si sacrum			
Cadere cu incapacitatea de a suporta greutatea	RX pelvin (I) plus RX lateral sold (I)	Indicat (C)	
K18			
Sangerare uretrala si leziune pelvina	Uretrograma retrograda (II)	Indicat (C)	
K19			
Trauma coccis sau coccidinia	RX coccis (I)	Nu e indicat de rutina (C)	
K20			
Membre superioare			
Leziune umar	RX umar (I)	Indicat (B)	

PACHET AMBULATOR

	K21		
Leziune cot	K22	RX cot (I)	Indicat (B)
Leziune articulatie radio-carpiana	K23	RX artic.radio-carpiana (I) MN (II) sau RMN (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
Membre inferioare			
Leziune genunchi (trauma cadere/obiect contondent)	K24	RX genunchi (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Leziune glezna	K25	RX glezna (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Leziune laba piciorului	K26	RX laba picior (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Fractura de stress		RX (I)	Indicat (B)
	K27	MN (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
Corpul strain			
Leziune de tesuturi moi: corp strain (metalic, sticla, lemn lacuit)	K28	RX (I)	Indicat (B)
Leziune de tesuturi moi: corp strain (plastic, lemn)	K29	RX (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Corp strain inghitit suspectat in faringe sau regiunea esofagiana superioara (pentru copii, vezi sectiunea M)	K30	US (0) RXA (II)	Indicat (B) Nu e indicat de rutina (B)
Corp strain inghitit: plan si mic (ex. moneda)		RXC (I)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

	K31	RXA (II)	Nu e indicat de rutina (B)
Corp stran ascutit sau potential otravitor, inghitit: (ex. baterie)		RXA (II)	Indicat (B)
	K32	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Corp stran inghitit: obiect mare (ex. proteza dentara)		RXC (I)	Indicat (B)
Torace			
Trauma toracica: minora	K34	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Trauma toracica: moderata	K35	RXC (I)	Indicat (B)
Leziune injunghiata	K36	RXC (I)	Indicat (C)
Fractura sternala	K37	RX lateral stern (I)	Indicat (C)
Abdomen (inclusiv rinichi). Leziune injunghiata sau cu obiect contondent	K38	RXA (II) in pozitie culcat + RXC (I) vert.	Indicat (B)
Trauma renala	K39	Imagistica	Indicat (B)
Trauma majora			
Trauma majora – examen general pacient inconscient sau confuz	K40	RXC coloana (I), RX pelvis (I), CT craniu (II)	Indicat (B)
Trauma majora – abdomen / bazin		RXC (I), RX pelvis (I)	Indicat (B)
	K41	CT abdominal (III)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

Trauma majora – torace	RXC (I)	Indicat (B)
K42	CT toracic (III)	Indicat (B)
L. Cancer		
Parotida		
Diagnostic	US (0)	Indicat (B)
L1	RMN (0) sau CT (II)	Indicat (B)
Stadializare	RMN (0) sau CT (II)	Indicat (B)
Laringe		
Diagnostic	Imagistica	Nu e indicat de rutina (B)
L3		
Stadializare	CT (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
L4		
Tiroidea		
Diagnostic	US (0) si MN (I)	Indicat (A)
L5		
Stadializare	CT (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
L6	MN (IV)	Indicat (B)
Plamani		
Diagnostic	RXC PA si lat. (I)	Indicat (B)
L7	CT (III)	Indicat (B)
Stadializare	CT torace, abdominal sup. (III)	Indicat (B)
	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
L8	MN (IV)	Investigatie specializata (B)
Esofag		
Diagnostic	Bariu (II)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

	L9		
Stadializare		CT (III)	Indicat (B)
	L10	US transesofagian (0)	Indicat (A)
Ficat: leziune primara			
Diagnostic		US (0)	Indicat (B)
	L11	RMN (0) sau CT (III)	Indicat (B)
Stadializare		RMN (0) sau CT (III)	Indicat (B)
Ficat: leziune secundara			
Diagnostic		US (0)	Indicat (B)
	L13	CT (III) sau RMN (0)	Indicat (B)
Pancreas			
Diagnostic		Imagistica	Indicat (B)
	L14		
Stadializare		CT (III) sau RMN (0) abdomen	Indicat (B)
Colon si rect			
Diagnostic		Enema bariu (III) sau colonoscopie	Indicat (B)
	L16		
Stadializare		US (0)	Indicat (B)
	L17	CT (II) sau RMN (0) abdomen, bazin	Indicat (B)
Recurenta		US (0) ficat	Indicat (B)
		CT (III) sau RMN (0) abdomen, bazin	Indicat (B)
	L18	MN (IV)	Investigatie specializata (B)
Rinichi			

PACHET AMBULATOR

Diagnostic L19	US (0)	Indicat (B)
Stadializare	CT (III) sau RMN (0) abdomen	Indicat (B)
	CT (III) toracic	Nu e indicat de rutina (B)
L20	MN (I)	Investigatie specializata (C)
Recurrenta L21	CT (III) abdomen	Indicat (B)
Vezica		
Diagnostic L22	Imagistica	Nu e indicat de rutina (B)
Stadializare	IVU (II)	Indicat (B)
L23	CT (III) sau RMN (0) abdomen si bazin	Indicat (B)
Prostata		
Diagnostic L24	US transrectal (0)	Indicat (B)
Stadializare	RMN (0) / CT (III) bazin	Investigatie specializata (B)
L25	MN (II)	Indicat (A)
Testicule		
Diagnostic L26	US (0)	Indicat (B)
Stadializare L27	CT (III) torace, abdomen, bazin	Indicat (B)
Urmarire	CT (III) abdomen	Indicat (B)
L28	MN (IV)	Investigatie specializata (C)
Ovare		
Diagnostic	US (0)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

	L29		
Stadializare	L30	CT (III) / RMN (0) abdomen, bazin	Investigatie specializata (B)
Urmarire	L31	CT (III) abdomen, bazin	Investigatie specializata (B)
Uter: col uterin			
Diagnostic	L32	Imagistica	Nu e indicat de rutina (B)
Stadializare	L33	RMN (0) / CT (III) abdomen si bazin	Indicat (B)
Recidiva	L34	RMN (0) / CT (III) abdomen si bazin	Investigatie specializata (B)
Uter: corp uterin			
Diagnostic	L35	US (0) sau RMN (0)	Indicat (B)
Stadializare	L36	RMN (0) sau CT (III)	Investigatie specializata (B)
Limfom			
Diagnostic		CT (III)	Indicat (B)
	L37	MN (III)	Investigatie specializata (B)
Stadializare	L38	CT (III) torace, abdomen, bazin	Indicat (B)
Urmarire		CT (III) sau RMN (0)	Indicat (B)
	L39	MN (III)	Investigatie specializata (B)
Tumori musculo-scheletale			
Diagnostic	L40	RX (I) + RMN (0)	Indicat (B)
Stadializare		RMN (0) afectare locala + CT toracic (III)	Investigatie specializata (C)

PACHET AMBULATOR

	L41		
Metastaze din tumora primara necunoscuta			
Diagnosticul leziunii primare	L42	Imagistica	Nu e indicat de rutina (C)
San – vezi Sectiunea J			
M. Pediatrie			
<i>Minimalizati iradierea copiilor, in special a celor cu probleme pe termen lung (pentru lezuni craniene la copii vezi Sectiunea K Traume) CNS</i>			
Boli congenitale	M1	RMN (0)	Indicat (C)
Craniu cu aspect anormal – hidrocefalie – suturi neobisnuite	M2	US (0) RXS (I)	Indicat (B) Investigatie specializata (C)
Epilepsie		RXS (I)	Nu e indicat de rutina (B)
	M3	RMN (0) sau MN (II)	Investigatie specializata (B)
Surditate la copii	M4	CT (II) RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Hidrocefalie – malfunctie de sunt		RX (I)	Indicat (B)
	M5	US (0) sau RMN (0)	Indicat (B)
Intarziere in dezvoltare – paralizie cerebrală	M6	RMN cranial (0)	Investigatie specializata (B)
Dureri de cap		RXS (I)	Nu e indicat de rutina (B)
	M7	RMN (0) sau CT (II)	Investigatie specializata (B)
Sinuzita vezi si A13	M8	RX sinus (I)	Nu e indicat de rutina (B)

PACHET AMBULATOR

Gat si coloana – pentru traume vezi Sectiunea K		
Torticolis fara trauma M9	RX (I)	Nu e indicat
Durere de spate sau in zona gatului M10	RX (I) MN (II) RMN (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B) Investigatie specializata (B)
Spina bifida oculta M11	RX (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Pata paroasa, adancitura sacrala M12	RX (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Locomotor		
Leziune neaccidentala – abuz asupra copilului (pentru lezuni craniene, vezi Sectiunea K) M13	RX (I) parti afectate MN (II)	Indicat (B) Indicat (B)
Lezuni ale membrelor: comparatie cu partea opusa M14	RX (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Mic de statura, tulburari de crestere M15	RX (I) pentru varsta osoasa	Indicat la intervale adevcate (B)
Sold iritabil M16	US (0)	Indicat (B)
Schiopatat M17	RX bazin (I) US (0) sau MN (II) sau RMN (0)	Indicat (C) Investigatie specializata (B)
Durere focar osos M18	RX (I) si US (0) MN (II) sau RMN (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
Sold – dislocare M19	US (0)	Indicat (B)
Boala Osgood-Schlatter	RX genunchi (I)	Nu e indicat de rutina (C)

PACHET AMBULATOR

	M20		
Cardio-toracic			
Infectie acuta in piept	M21	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Tuse productiva recurrenta	M22	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Corp strain inhalat (suspectare) (vezi Sectiunea K)	M23	RXC (I)	Indicat (B)
Respiratie suieratoare (wheeze)	M24	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Sunet respirator acut (stridor)	M25	RX gat (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Murmur al inimii	M26	RXC (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Gastrointestinal – pentru probleme abdominale generale vezi si Sectiunea G			
Intususceptie	M27	RXA (II) Imagistica ulterioara	Indicat (C) Investigatie specializata (B)
Inghitire corp strain (vezi Sectiunea K)		RXA (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	M28	RXC (I) inclusiv gat	Indicat (C)
Trauma abdominala minora	M29	RXA (II)	Nu e indicat de rutina (C)
Vomitatul proiectil	M30	ECHO (0)	Indicat (A)
Vomitatul recurrent	M31	Examinare contrast gastrointestinal superior	Nu e indicat de rutina (C)
Incerc neonatal persistent	M32	ECHO (0) MN (II)	Indicat (B) Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

Sangerare rectala M33	MN (II)	Investigatie specializata (B)
Constipatia M34	RXA (II) Enema de contrast	Nu e indicat de rutina (C) Nu e indicat de rutina (B)
Masa tumorala abdominala/ pelvina palpabila M35	ECHO (0) si RXA (II)	Indicat (B)
Uroradiologie		
Enurezis M36	Imagistica	Nu e indicat de rutina (B)
Incontinenta urinara M37	ECHO (0) IVU (II)	Indicat (B) Indicat
Testicul nepalpabil M38	ECHO (0)	Indicat (B)
Diagnostic antenatal de dilatare a tractului urinar M39	ECHO (0)	Indicat (B)
Infectie de tract urinar dovedita M40	Imagistica ECHO (0) / MN (II) / cistogramie (III)	Investigatie specializata (C)