

Examenul de bacalaureat național 2013

Proba E. c)

Matematică *M_șt-nat*

Barem de evaluare și de notare

Varianta 2

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$2(1+i) = 2 + 2i$ $x = 2 \in \mathbb{R}$	3p 2p
2.	$f(2) = 0$ $f(1) \cdot f(2) \cdot \dots \cdot f(5) = 0$	3p 2p
3.	$x^2 + 1 = x^2 + 2x + 1$ Rezultă $x = 0$, care verifică ecuația	2p 3p
4.	Numerele de două cifre având produsul cifrelor egal cu 5 sunt 15 și 51 \Rightarrow 2 cazuri favorabile Numărul numerelor naturale de două cifre este 90 \Rightarrow 90 de cazuri posibile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{1}{45}$	2p 1p 2p
5.	$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ $AC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$	3p 2p
6.	$E\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{6}$ $= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 3 =$ $= 5 - 6 = -1$	3p 2p
b)	$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 12 \\ 18 & 31 \end{pmatrix}$ $A^2 - 6A = \begin{pmatrix} 7 & 12 \\ 18 & 31 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 18 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$	2p 3p
c)	$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det B = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1$ $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$	2p 3p
2.a)	$2 * 2 = \sqrt{2^2 + 2^2 + 4} =$ $= \sqrt{12}$	2p 3p
b)	$\sqrt{x^2 + x^2 + 4} = \sqrt{12} \Leftrightarrow 2x^2 + 4 = 12$ $x = -2$ sau $x = 2$	2p 3p

c)	$\underbrace{1 * 1 * \dots * 1}_{1 \text{ de } 8 \text{ ori}} = \sqrt{8 \cdot 1^2 + 4 \cdot (8-1)} = \sqrt{36}$	3p
	$\underbrace{1 * 1 * \dots * 1}_{1 \text{ de } 8 \text{ ori}} = 6 \in \mathbb{Z}$	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = (e^x)'(x^2 - 6x + 9) + e^x(x^2 - 6x + 9)' =$	3p
	$= e^x(x^2 - 6x + 9) + e^x(2x - 6) = e^x(x^2 - 4x + 3)$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$	2p
b)	$f''(x) = e^x(x^2 - 2x - 1)$	2p
	$f(x) + f''(x) = e^x(2x^2 - 8x + 8) = 2(f'(x) + e^x)$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$	3p
c)	$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ sau } x = 3$	2p
	$f'(x) > 0$ pentru $x \in (-\infty, 1)$, $f'(x) < 0$ pentru $x \in (1, 3)$ și $f'(x) > 0$ pentru $x \in (3, +\infty)$	2p
	Punctele de extrem sunt $x_1 = 1$ și $x_2 = 3$	1p
2.a)	$\int_0^1 (x+1)f(x) dx = \int_0^1 \frac{x(x+1)}{x+1} dx = \int_0^1 x dx =$	2p
	$= \frac{x^2}{2} \Big _0^1 = \frac{1}{2}$	3p
b)	$\int_0^1 x^2 f(x) dx + \int_0^1 x^3 f(x) dx = \int_0^1 \frac{x^3}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{x^4}{x+1} dx =$	2p
	$= \int_0^1 \frac{x^3(x+1)}{x+1} dx = \int_0^1 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big _0^1 = \frac{1}{4}$	3p
c)	$V = \pi \int_1^2 h^2(x) dx = \pi \int_0^1 \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 dx = \pi \int_0^1 \left(1 - \frac{2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}\right) dx =$	3p
	$= \pi \left(x - 2 \ln(x+1) - \frac{1}{x+1}\right) \Big _0^1 = \pi \left(\frac{3}{2} - 2 \ln 2\right)$	2p